



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Inhoudsopgave

<u>Hoofdstuk</u>	<u>Indicatie</u>	<u>Pagina</u>
1.	Baarmoederaandoeningen	2
2.	Vruchtbaarheid	3
3.	Uieraandoeningen	4-5
3.	Maagdarm-aandoeningen	6-7
4.	Longaandoeningen	8-9
5.	Kreupelheden	10
6.	Stofwisselingsstoornissen	11
7.	Algemeen	12-13
8.	Vaccins	14
9.	Verklarende woordenlijst	15



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Hoofdstuk 1 Baarmoederaandoeningen						
Indicatie	Geneesmiddel REGNL	Dosering	Behandelings duur	Wachttijd dagen		Opmerkingen
				Vlees (IKB)	Melk	
Aan de nageboorte blijven staan	Nageboorte capsule TTC 8260	1 capsule	Eenmalig	10	4	
	Geomycine schuimtablet 2398	1-2 tabletten per dag in de baarmoeder.	Ged 1-3 dagen	35	5	
Acute baarmoeder ontsteking	Metricure 8522	1 injector in de baarmoeder	Eenmalig	1	0	
	Excenel RTU 10061	2 ml per 100 kg l.g. per dag	Ged 5 dagen	8	0	Binnen 10 dgn na afkalven. Metritis door E-coli, Cbt pyogenes, Fusobact. necr.
Witvuilen	Tylan 200 Injectie 10100	2,5 – 5 ml per 100 kg l.g. per dag (im)	Ged 3-4 dagen	28	5	max 15 ml per injectieplaats. Metritis door Cbt. pyogenes
	Dinolytic 9242	5 ml (im)	Mag herhaald worden na 10- 12 dagen	0	0	



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Hoofdstuk 2 Vruchtbaarheid						
Indicatie	Geneesmiddel REGNL	Dosering	Behandelingsduur	Wachttijd dagen		Opmerkingen
				Vlees (IKB)	Melk	
Niet tochtig worden	Dinolytic 9242	5 ml (im)	Mag herhaald worden na 10-12 dagen	0	0	
	CIDR spiraal 10492	1 spiraal	Tenminste 7 dagen	0	0	Niet gebruiken voor 35 dgn na afkalven. 12 Uur na de eerst waargenomen bront, insemineren.
Afwijkende eierstok/Bruls	Fertagyl 1253	5 ml (im)	Eenmalig	0	0	
	CIDR spiraal 10492	1 spiraal	Tenminste 7 dagen	0	0	Niet gebruiken voor 35 dgn na afkalven. 12 Uur na de eerst waargenomen bront insemineren.



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Hoofdstuk 3 Uieraandoeningen 1						
Indicatie	Geneesmiddel REGNL	Dosering	Behandelingsduur	Wachttijd dagen		Opmerkingen
				Vlees (IKB)	Melk	
Uier- ontsteking: <i>Uierinjectoren</i>	Cobactan LC 9468	1 injector/ 12 uur	3 injectoren	4	5	
	Pathozone 1229	1 injector/ 48 uur	Eenmalig	3	6	
	Avuloxil 9427	1 injector / 12 uur	3 injectoren	7	4	
	Rilexine 9348	1 injector per 12 uur	Max. 3 injectoren	6	2	
	Ubrolexin 102306	1 injector per 24 uur	2 injectoren	10	5	
<i>Injectie- vloeistof</i>	Mamyzin 8652	1 ^e dag 10 ml daarna 5 ml per dag	3-4 dagen	10	3	Acute en subklinische mastitis door streptococcen en staphylococcen
	Enroxil 100 mg/ml 10488	2,5 – 5 ml /100 kg (sc)	3-5 dagen	14	5	E.coli mastitis
	Tylan inj 10100	1 ml / 20-40 kg lg (im)	3-4 dagen	28	5	Max 15 ml per inj plaats
	Dofatrim 8762	1 ml/15 kg (im)	3-5 dagen	14 (42)	3	5 ml per inj. plaats
<i>Droogzetters</i>	Drycloxacil 9934	1 injector / kwartier	Eenmalig	84	4	Droogstand minimaal 45 dagen
	Super mastidol 1790	1 injector / kwartier	Eenmalig	36	2,5	Droogstand minimaal 5 weken
	Orbenin extra dry cow 6901	1 injector / kwartier	Eenmalig	0	48 uur	Droogstand minimaal 42 dagen
<i>Slotgat sealers</i>	Orbeseal 10082	1 injector / kwartier	Eenmalig	0	0	Afsluiten slotgat na droogzetten

EEN DROOGSTAND VAN 6-8 WEKEN IS HET MEEST EFFECTIEF



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Hoofdstuk 3 Uieraandoeningen 2						
Indicatie	Geneesmiddel REGNL	Dosering	Behandelingsduur	Wachttijd dagen		Opmerkingen
				Vlees (IKB)	Melk	
Laten schieten van de melk	Oxytocin-ject 3030	1-4 ml (im of sc)	eenmalig	0	0	
Uierver- zorging	Wollen speenstiften	1 stift	eenmalig	0	0	



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Hoofdstuk 4 Maagdarmaandoeningen 1						
Indicatie	Geneesmiddel REGNL	Dosering	Behandelingsduur	Wachtijd dagen		Opmerkingen
				Vlees (IKB)	Melk	
Pensstimulans	Bovi C3	Volw rund 2x dgs 1 zakje Jonge rund ½ dos	2- 3 dagen	0	0	
Darm- ontsteking Kalf-diarree <i>Antibiotica Via voer of melk</i> <i>Via injectie</i>	Lodevil 1986	1-2 liter per infuus	Eenmalig	0	0	Bij uitdroging (UDD)
	Eurolectrol 1286	125 gram per 50 kg lg oplossen in 5 liter	5 liter verdelen over meerdere porties per dag	0	/	Kalveren
	Flumequine 50% wsp 8758	1 gram per 50 kg lg, 2x daags	3-5 dagen	2	/	Kalveren
	Trim/sul 80/420 2213	2.5 gr / 50 kg lg, 2x daags	Max 5 dagen	14	/	Kalveren
	Gabbrovet 70	25-50 gr/ 100 kg	3-5 dagen	28	/	Niet herkauwend kalf
	Cubarmix 7863	2,5 gr/ 100 kg 2x daags	5 dagen	12	/	Kalveren
	Halocur 9808	8-12 ml	7 dagen	13	/	Pasgeboren kalf
	Colistine 4800 WSP 7733	5 gr / 400 kg lg, 2x daags	5-7 dagen	7	/	Kalveren
	Ampisol 20% 1985	2,5-5 gr / 50 kg lg, 2x daags	Min 5 dagen	28	/	Kalveren
	Marbocyl 2% 9169	10 ml/ 100 kg lg (sc of im)	3-5 dagen	6	/	Alleen bij niet herkauwend kalf
	Enroxil 50 mg/ml 10487	0,5 – 1 ml/10 kg lg (sc)	5 dagen	14	/	Kalveren
	Dofatrim 8762	1 ml/15 kg (im)	3-5 dagen	14	3	



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Hoofdstuk 4 Maagdarmaandoeningen 2						
Indicatie	Geneesmiddel REGNL	Dosering	Behandelingsduur	Wachttijd dagen		Opmerkingen
				Vlees (IKB)	Melk	
Cocidiose <i>In de bek</i>	Baycox bovis 10427	3ml per 10 kg ingeven	eenmalig	63	/	Kalf, schema in overleg met dierenarts
	Vecoxan 9660	1 ml per 2,5 kg ingeven	eenmalig	0	/	Kalf, schema in overleg met dierenarts
Maagdarm- Wormen	Ivomec Eprinex pour-on 9033	1 ml /10 kg over de rug	Enmalig, indien nodig na 21 dagen herhalen	15	0	Niet binnen 28 dagen voor/na enting
	Panacur SR Bolus 8646	1 bolus	Enmalig	200	/	Kalf tussen 100 en 300 kg
	Dectomax 9844	1 ml/ 50 kg (sc)	Volgens advies dierenarts	75	/	Alleen bij niet melkgevend rund



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Hoofdstuk 5 Longaandoeningen 1						
Indicatie	Geneesmiddel REGNL	Dosering	Behandelingsduur	Wachttijd dagen		Opmerkingen
				Vlees (IKB)	Melk	
Longontsteking <i>Injectie</i>	Engemycine 10% 8291	1 ml/20- 25 kg (im)	Max 5 dagen	18	5	IKB kalf 42 dgn wachttijd
	Geomycine- ject 8488	1 ml/20 kg rund (im) 1-2 ml/10 kg kalf (im)	3-5 dagen	21	5	IKB kalf 42 dgn wachttijd
	Cobactan 9645	rund 2 ml/50 kg kalf 4 ml/50 kg (im)	Max 5 dagen	5	1	IKB kalf 20 dgn wachttijd
	Neopen 1556	1 ml/20 kg (im)	Max 3 dagen	56	3	
	Nuflor 7993	1 ml/15 kg (im) 2 ml/15 kg (sc)	2x met 48 uur tussentijd (im) Eenmalig (sc)	30 (im) 44 (sc)	/	Niet toedienen bij volw fokstieren
	Dofatrim- ject 8762	1 ml/ 15 kg lg (im)	3-5 dagen	14	3	
	Draxxin 10183	1 ml per 40 kg lg (sc)	Evt na 48 uur herhalen	49	/	Niet melkg. Rund + binnen 2 mnd voor afkalven
	Gentaject 10% 1637	0.2 ml/ 10 kg lg (im) 2x daags	3 dagen	139	/	Kalveren tot 13 weken
	Excenel RTU 10061	1 ml/ 50 kg lg (sc)	3 dagen	8	0	
	Oxy LA inj 8067	1 ml per 10 kg lg (im)	eenmalig	28	/	Niet melkg. Rund.
	Penstrep-ject 100679	1 ml per 25 kg lg (im)	3 dagen	56	5	Max 5 ml per inj plaats
	Enroxil 50 mg/ml 10487	0,5 – 1 ml/10 kg lg (sc)	5 dagen	14	/	Kalf. Niet gebruiken bij melkgevend rund
	Enroxil 100 mg/ml 10488	2,5-5 ml/ 100 kg lg (sc)	3-5 dagen	14	5	



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Hoofdstuk 5 Longaandoeningen 2							
Indicatie	Geneesmiddel REGNL	Dosering	Behandelingsduur	Wachttijd dagen		Opmerkingen	
				Vlees (IKB)	Melk		
<i>Melk</i>	Doxycycline hcl 8917	1 gr/ 100 kg lg verdeeld over 2 giften	3-5 dagen	14	/	Kalveren	
	Doxycycline 50% 8554	1 gr / 100 kg lg 2x daags	4-5 dagen	28	/	Kalveren	
	Oxytetracycline hcl 9617	05-1 gr/ 100 kg lg 2x daags	3-5 dagen	8	/	Kalveren	
	Broomhexine 2% 2161	750 mg/50 kg lg 2x daags	3 dagen	0	/	Kalveren	
	Trim/sul 80/420 2213	2.5 gr / 50 kg lg, 2x daags	Max 5 dagen	14	/	Kalveren	
	<i>In de bek</i>	Ampisol 20% 1985	2x daags, 2,5-5 gr/ 50 kg lg	Minimaal 5 dagen	28	/	Kalveren
		Flumequine 50% WSP 8758	1 gr/ 50 kg lg, 2 x daags	3-5 dagen	2	/	Kalveren
		Baytril 2,5% 2912	5 -10 ml per 50 kg oraal ingeven	3-5 dagen	7	/	Kalveren
Longwormen	Ivomec Eprinex pour-on 9033	1 ml /10 kg over de rug	Eenmalig, indien nodig na 28 dagen herhalen	15	0	Niet binnen 28 dagen voor/na enting	
	Panacur SR Bolus 8646	1 bolus	Eenmalig	200	/	Kalf tussen 100 en 300 kg	
	Dectomax 9844	1 ml/ 50 kg (sc)	Volgens advies dierenarts	75	/	Alleen bij niet melkgevend rund	



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Hoofdstuk 6 Kreupelheden 1						
Indicatie	Geneesmiddel REGNL	Dosering	Behandelingsduur	Wachttijd dagen		Opmerkingen
				Vlees (IKB)	Melk	
Tussenklauw Ontsteking	Dofatrim 8762	1 ml/15 kg (im)	3-5 dagen	14	3	
	Geomycine 8488	1 ml/20 kg rund (im) 1-2 ml/10 kg kalf (im)	3-5 dagen	21	5	IKB wachttijd kalf 42 dagen
	Amoxycolin 9081	1 ml/ 10 kg lg (im)	Ged 3 dagen	42	3	Max 20 ml per inj plaats
	Penstrep-ject 100679	1 ml per 25 kg lg (im)	3 dagen	56	5	Max 5 ml per inj plaats
	Excenel RTU 10061	1ml/ 50 kg (sc)	3 dagen	8	0	
Stinkpoot	CTC spray 9013	Sprayen tot het te behandelen oppervlak bedekt is	Eventueel herhalen	0	0	
Gewrichts- ontsteking	Cobactan 9645	Rund 2 ml/50 kg Kalf 4ml/50 kg (im)	Max 5 dagen	5 (kalf 20)	1	
	Excenel RTU 10061	1ml/ 50 kg (sc)	3 dagen	8	0	
	Neopen 1556	1 ml / 20kg lg (im)	3 dagen	56	3	
	Marbocyl 2% 9169	10 ml/ 100 kg lg (im of sc)	3-5 dagen	6	/	Alleen herkauw kalf
	Nuflor 7993	1 ml/ 15 kg (im) 2 ml/ 100 kg (sc)	2x met 48 tussentijd (im) eenmalig (sc)	30 (im) 44 (sc)	/	Niet bij lact melkkoeien



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Hoofdstuk 7 Stofwisselingsstoornissen						
Indicatie	Geneesmiddel REGNL	Dosering	Behandelingsduur	Wachtijd dagen		Opmerkingen
				Vlees (IKB)	Melk	
Kalfziekte	Calcium magnesium ject 4628	450 ml / Rund Langzaam IV	Indien nodig na 4-6 uur herhalen	0	0	Snelwerkend, kortwerkend
	Calcium magne- sium tonicum 7781	500 ml per dier oraal	Zo nodig na 12 uur herhalen	0	0	Langzaamwerk end, langwerkend
	Calci tat inj 3745	100-150 ml / 500 kg 1.g (iv)	Na 6 uur evt herhalen, daarna na 24 uur pas weer	0	0	Middel- langwerkend
Slepende melkziekte	Propyleenglyol 2628	2x daags 250 ml oraal	4 dagen	0	0	Combineren met voreen 10 ml 1x
Zucht	Diurizone poeder	1 ^e dag 2 zakjes daarna 2 dagen 1 zakje	4 dagen	28	28	OFF LABEL Niet bij dragende dieren
Stofwisse- lings pro- blemen	Catosal 6025	Rund: 10-25 ml Kalf: 5-12 ml	Evt herh na 1-2 weken	0	0	(UDD)
Navel- Ontsteking kalf	Ampicilline 20% 8480	1 ml/ 20 kg lg 2x daags (im)	3-5 dagen	10	2	
	Neopen 1556	1 ml/ 20 kg lg (im)	3 dagen	56	3	Max. 25 ml per injectieplaats



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Hoofdstuk 8 Algemeen 1						
Indicatie	Geneesmiddel REGNL	Dosering	Behandelingsduur	Wachttijd dagen		Opmerkingen
				Vlees (IKB)	Melk	
Huid- en verzorgende middelen	Acederm spray 5121	2 x daags aanbrengen	Evt. herhalen	0	0	Wondherstel
	CTC spray 9013	Sprayen tot het te behandelen oppervlak bedekt is	Indien nodig herhalen	0	0	Wond schoonmaken voor toepassen
	Sunlitan zink spray	Sprayen tot het te behandelen oppervlak bedekt is	Indien nodig herhalen	0	0	Wond Schoonmaken voor toepassen
	Uiercreme					
Huid-schimmel	Imaverol 8608	Wassen met verdunning	3-4x met een tussentijd van 3-4 dagen	7	2	Verdunning 1 op 50
Schurft	Ivomec Eprinex pour-on 9033	1 ml /10 kg over de rug	Eenmalig, indien nodig na 28 dagen herhalen	15	0	Niet binnen 28 dagen voor/na enting
	Tactic 9342	20ml/ 10 liter water	Na 7-11 dagen herhalen	4	4	
	Dectomax 9844	1 ml/ 50 kg (sc)	Volgens advies dierenarts	75	/	Alleen bij niet melkgevend rund



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Hoofdstuk 8 Algemeen 2

Indicatie	Geneesmiddel REGNL	Dosering	Behandelings duur	Wachttijd dagen		Opmerkingen
				Vlees (IKB)	Melk	
IJzergebrek	Pig-iron ject 3159	Kalf 2-6 ml Rund 2.5-5 ml	eenmalig	0	0	
Vitaminen en spore- elementen	Multivitamine inj 4708	5-10 ml per dier	eenmalig	0	/	Alleen kalf
	Vitasol multi 4147	3-5 ml per dag/ dier	Ged 5 dagen	0	0	
Urineweg infecties	Penstrep-ject 100679	1 ml per 25 kg lg (im)	3 dagen	56	5	Max 5 ml per inj plaats
	Dofatrim 8762	1 ml/15 kg (im)	3-5 dagen	14	3	
Koortswerend, pijnstillend, ontstekingsrem- mend	Dexadreson 9452	3 ml/ 100 kg (im)	eenmalig	7	5	
	Finadyne 9847	1-2 ml / 50 kg (iv)	eenmalig	7	1	UDD
	Natrium- salicylaat 8913	40 mg/ kg	1-3 dagen	0	0	
	Voreen 2875	1 ml / 50 kg (im)	eenmalig	16	5	
	Novem 20 10219	2,5 ml/ 100 kg	eenmalig	15	5	
	Melovem 5mg/ml 103350	10 ml/ 100 kg (sc)	eenmalig	15	/	Niet bij melkgevend rund
	Buscopan 8944	5 ml/ 100 kg (im)	eenmalig	15	/	Niet bij melkgevend rundvee
Eetlust opwekker	Mederantil 3563	1 ml / 100 kg (iv)	eenmalig	1	0	UDD
Blue Tongue	Butox	> 100 kg : 10 ml 100-300kg: 20 ml < 300 kg: 30 ml	In overleg met dierenarts	28	28	OFF LABEL
	Vaccinatie zie hoofdstuk 9					



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Hoofdstuk 9 Vaccins						
Indicatie	Geneesmiddel REGNL	Dosering	Behandelings duur	Wachttijd dagen		Opmerkingen
				Vlees (IKB)	Melk	
BVD	Bovilis BVD 9587	2 ml 2x met een interval van 4 weken. 2 ^e enting ten minste 4 wkn voor de dracht.	Entschema in overleg met de dierenarts	0	0	
IBR	Bovilis IBR marker live 9675	2 ml herhalen na 6 maanden	Entschema in overleg met de dierenarts	0	0	Vanaf 3 weken leeftijd
	Bovilis IBR marker inac	2ml 2x met een interval van 4 weken, herhalen na 6 maanden	Entschema in overleg met de dierenarts	0	0	Vanaf 3 maanden leeftijd
Blauwtong	BTV pur AIsap 102440	1 ml (sc) na 3-4 weken herhalen daarna jaarlijks	Entschema in overleg met de dierenarts	0	0	Vanaf 1 maand leeftijd
Longworm	Bovilis Longworm 3219	25 ml 2x met een interval van 4 weken	Entschema in overleg met de dierenarts	0	0	Vanaf 6 weken leeftijd
Kalverdiarree	Rotavec corona 9696	2 ml (im) eenmalig	Entschema in overleg met de dierenarts	0	0	Tussen de 12 en 3 weken voor afkalven
Pinkengriep	Bovilis Bovipast RSP 9260	5 ml 2x met een interval VAN 4 WEKEN	Entschema in overleg met de dierenarts	0	0	Vanaf 6 weken – 3 maanden leeftijd
Ringworm	Bovilis Ringvac 7814	2ml 2x met een interval van 10-14 dagen	Entschema in overleg met de dierenarts	14	/	Vanaf leeftijd van 4 maanden



Medicijnwijzer voor runderen

DAP De Eenhoorn

Verklarende woordenlijst

i.m.....Intra musculair = in de spier

i.v.....Intra veneus = in de ader

oraal.....Via de mond ingeven

s.c.....Subcutaan = onder de huid

UDD.....Uitsluitend door de dierenarts te gebruiken

OFF LABEL.....Mag alleen worden gebruikt indien er geen andere middelen
.....geregistreerd zijn voor de aandoening.

**DAP De Eenhoorn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de wachttijden.
Deze lijst is aan voortdurende verandering onderhevig.
Neem bij twijfel contact op met de dierenarts.
Deze lijst vervangt alle vorige lijsten.**